## Evaluación de los riesgos y síntomas de la degeneración macular asociada con la edad

La degeneración macular asociada con la edad (AMD, por sus siglas en inglés) es la causa principal de la pérdida de visión entre los envejecientes estadounidenses. Es un trastorno ocular progresivo en el que una parte de la retina, llamada mácula, se deteriora con la edad. La mácula es responsable de la visión central y nos permite hacer cosas como leer, ver televisión, reconocer caras y conducir.

Factores de riesgo para el DMAE  Existen varios factores que puedan aumentar el riesgo de desarrollar DMAE, incluyendo los siguientes. Marque todos los que correspondan:		
□ 50 años de edad o mayor	□ Fumador actual o en el pasado	
☐ Historial de familia de DMAE	□ Sobrepeso	
☐ Caucásico (blanco)	<ul> <li>Enfermedad del corazón, presión arterial alta o nivel de colesterol alto</li> </ul>	
Debido a que la disminución de la vista nocturna es un síntoma común del DMAE, usamos el dispositivo de AdaptDx para medir la cantidad de minutos que le toma adaptarse de la luz brillante a la oscuridad. Este número es su Rod Intercept™ (RI™) cual nos ayuda a detectar el DMAE en sus primeras etapas. La prueba AdaptDx no es invasiva y tarda de 5 a 10 minutos para completar.		
Primeros síntomas del AMD  Antes de que se puedan ver cambios estructurales en la parte posterior del ojo, usted puede tener los siguientes síntomas primarios. Marque todos los que correspondan:		
☐ Dificultad para ver de noche [	☐ Dificultad para navegar de noc	che Dificultad para leer con con luz tenue
Otros problemas viendo de noche (especifique)		
Nombre del paciente	Firma del paciente	Fecha

